

Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		11/12/2023	29/11/2023
Canard chipeau	↑	309	237
Canard colvert	↑	852	758
Canard pilet	↑	1127	995
Canard siffleur	↑	22	3
Canard souchet	↓	480	678
Cygne tuberculé	NE	8	3
Fuligule milouin	↓	51	62
Fuligule morillon	NE	3	0
Oie cendrée	↑	117	65
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	→	2356	2522
Sarcelle d'été			
Tadorne de belon			
Fuligule à tête noire	NE	1 ♀	2 ♀
Fuligule milouinan	NE	2 ♂ + 2 ♀	2 ♂ + 2 ♀
Fuligule nyroca		0	0
Harelde boréale	NE	1	1
Nette demi-deuil	NE	1 ♀	0
Foulque macroule	↑	233	114
Gallinule poule d'eau	NE	0	7
Grand cormoran	↓	53	95

Grèbe huppé	NE	8	14
Grèbe castagneux	NE	5	0
Grèbe à cou noir	NE	6	3
Martin pêcheur			1
Râle d'eau	NE	11	8

Aigrette garzette	→	41	45
Bihoreau gris			
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	1	4
Crabier chevelu			
Flamant rose	NE	5	1
Grande aigrette	↓	3	21
Grue cendrée	↓	184	342
Héron cendré	→	36	36
Héron garde-bœuf			
Héron pourpré			
Ibis falcinelle			
Spatule blanche	NE	0	11

Avocette élégante			
Barge à queue noire			
Barge rousse			
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	↑	71	19
Bécassine des marais	↑	23	14
Chevalier aboyeur	NE	0	1

Chevalier arlequin	NE	0	1
Chevalier cul-blanc			
Chevalier gambette			
Chevalier guignette			
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE	1	0
Combattant varié			
Phalarope à bec large	NE	0	0
Grand gravelot			
Petit gravelot			
Pluvier doré			
Vanneau huppé	↓	346	442

Balbuzard pêcheur	NE	1	0
Busard des roseaux	NE	4	10
Busard saint-martin			
Buse variable			
Epervier d'Europe			
Faucon crécerelle	NE	0	1
Faucon pèlerin	NE	0	1 ♂
Élanion blanc	NE	0	1
Milan royal			
Pygargue à queue blanche	NE	1	0

Goéland brun			
--------------	--	--	--

Goéland leucophée	NE	0	2
Goéland marin			
Mouette pygmée	NE	3	0
Mouette rieuse	NE	4	8
Sterne sp.		0	0
Sterne pierregarin	NE	0	0
Grand corbeau	NE	1	

Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs

Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable » Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.

Variation d'effectifs Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.

Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.

Protocole

Les comptages sont idéalement réalisés 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.